

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa guidata della vite N° 12 del 27/07/2017

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda l'obbligo di effettuare il secondo trattamento contro il vettore

dal 27 luglio al 3 agosto 2017

con uno dei seguenti principi attivi, alle dosi di etichetta:

***THIAMETHOXAM (t.c. 21 gg.) o
ACETAMIPRID (t.c. 14 gg.)***

I viticoltori che hanno effettuato il primo trattamento con Tiametoxam o Acetamiprid NON DEVONO UTILIZZARE LA STESSA SOSTANZA ATTIVA MA ALTERNARE IL PRODOTTO, prestando attenzione nella scelta ai rispettivi tempi di carenza(t.c.). Per trattamenti in prossimità della vendemmia si consigliano trattamenti con piretroidi registrati

ALTRI PRINCIPI ATTIVI:

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
CLORPIRIFOS ETILE (utilizzo entro il 30 luglio 2017 aziende che aderiscono all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-20)	Fosfororganici	30
CLORPIRIFOS METILE	Fosfororganici	15
ETOXENPROX	Fenossibenil eteri	14
Varie	Piretroidi	vari

DOPO IL TRATTAMENTO E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ELIMINARE LA VEGETAZIONE SINTOMATICA PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE.

Salvaguardia degli insetti pronubi (Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- NON trattare in luglio e agosto in presenza di melata di metcalfa; nel caso intervenire prima del trattamento insetticida con Sali Potassici come lavaggio della melata.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.