

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/05

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA
INTEGRATA

DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA GAVIESE

Bollettino di difesa guidata della vite

n° 4 dell' 08/06/2018

Fase fenologica prevalente: **Fine fioritura – inizio allegagione**

PERONOSPORA

Considerata la fase fenologica particolarmente sensibile agli attacchi della malattia, le precipitazioni e l'umidità che generano una costante bagnatura fogliare, si consiglia di mantenere la copertura delle viti con prodotti sistemici a base di:

Dimetomorf, Ametoctradina, Bentiavalicarb, Iprovalicarb, Mandipropamid, Valifenalate.

In alternativa o in miscela con i prodotti sistemici è possibile utilizzare, se non si è ancora raggiunto il limite **massimo di 3 APPLICAZIONI**,
Mancozeb, Folpet, Metiram, Propineb.

OIDIO

La particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, induce a consigliare di unire all'antiperonosporico un prodotto **antioidico sistemico (I.B.E.)**,
Si ricorda che alcuni principi attivi possono essere impiegati una sola volta (Ciproconazolo, Difenconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo e Futriafol) quindi, se già utilizzati, occorrerà ricorrere ad una molecola differente sempre appartenete al gruppo dei triazoli.

Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui territori a vigneto dei Comuni aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole dell'area Gaviese - Novese e ne è vietata la diffusione in altri Comuni non convenzionati. Il Comitato di coordinamento fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non autorizzata delle presenti informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati.”

Coldiretti
Novi Ligure
0143/75440

Confagricoltura
Novi Ligure
0143/2633

CIA
Novi Ligure
0143/72176