

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA DI OVADA

Allegato al Bollettino di difesa della vite n° 7 del 27 LUGLIO 2016

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI

Secondo trattamento: dal 28 luglio al 1 agosto 2016

STRATEGIA CONSIGLIATA

I viticoltori che hanno effettuato il primo trattamento con clorpirifos etile o etofenprox devono intervenire con

CON FORMULATI A BASE DI

THIAMETHOXAM o ACETAMIPRID

alle dosi di etichetta dei formulati commerciali

Per trattamenti in prossimità della

vendemmia (ad esempio per base

spumante) si consigliano trattamenti con

piretroidi registrati

I viticoltori che hanno effettuato il primo trattamento con thiamethoxam o acetamiprid

NON DEVONO UTILIZZARE LA STESSA

SOSTANZA ATTIVA, ma alternare i prodotti

DOPO IL TRATTAMENTO E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).

Salvaguardia degli insetti pronubi (Legge regionale 3/8/98, n. 20)

- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- NON trattare in luglio e agosto in presenza di melata di metcalfa; nel caso intervenire prima del trattamento insetticida con Sali Potassici come lavaggio della melata.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.