



## DISERBO VITE

AVVERSITA'	NORMATIVA 214.1	PRINCIPIO ATTIVO	PRODOTTO COMMERCIALE	DITTA	N° REG.	Classe T 2006	DOSE P.C. (Kg-lt/Ha)	NOTE
GRAMINACEE E DICOTILEDONI	(1) Esclusivamente nei nuovi impianti, nei promi due anni è ammesso 1 solo intervento localizzato sulla fila  (2) Da utilizzare in miscela con prodotti sistemici  (3) Solo nelle aree colpite da giallumi della vite eseguire interventi localizzati esclusivamente nella zone infestate da Convolvolo, Atremisia ed Ortica. Trattare entro aprile o dopo la vendemmia  Autorizzato ad anni alterni solo sulla fila. Vietato nei terreni sabbiosi	CARFENTRAZONE ETIL (4)	SPOTLIGHT PLUS	ISAGRO - SIAPA BELCHIM	13466	Xi N	0,3	(4) <b>max 0,3 lt/ha</b> per intervento in associazione ad erbicidi sistemici (Glyphosate) non superando la soglia massima annua di 1 lt/Ha  Il dosaggio più alto è riferito ad applicazioni contro le specie perennanti
		ISOXABEN (1)	GALLERY	DOW AGRO	8146	--	0,75-1,25	
		CICLOXIDIM	STRATOS ULTRA STRATOS	BASF BASF	10117 7984	Xi Xi N	2,0-4,0 1-2	
		MCPA (3)	FENOXILENE MAX VALGRAN REGGRAN SL	SIPCAM SCAM ISAGRO	3767 619 12540	-- -- --	1,5 2,5 1,8	
		FLAZASULFURON	CHIKARA	BELCHIM	10929	N	0,07	
INFESTANTI		PENDIMENTALIN	STOMP ACQUA	BASF	13093	N	2	
SPOLLONANTE		CARFENTRAZONE ETHYL(5)	SPOTLIGHT PLUS	ISAGRO BELCHIM SIAPA	13466	Xi, N	1	(5) <b>max 1 lt/ha</b> per intervento entro la soglia massima annua di 1 lt/Ha per anno; intervallo di sicurezza 7 giorni
<p><b>N.B.</b> Per il diserbo sulla fila si precisa che la dose in tabella è riferita alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva. Per esempio, trattando il 50% della superficie totale, la quantità di Glifosate (30,4%) che viene distribuito annualmente su un ettaro di coltura è pari a 3,5 litri.</p>								