

DIFESA BIOLOGICA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 11 del 08.08.2024

Fase fenologica prevalente: **Chiusura grappolo**

-----BIOLOGICO-----

PERONOSPORA

Trattare

La grande quantità di inoculo e le condizioni meteorologiche tutt'altro che stabilizzatesi, fanno sì che ad ogni pioggia o rugiada possa partire una nuova infezione peronosporica.

Si consiglia pertanto di proseguire con prodotti a base di **Rame**.

La vegetazione dovrà rimanere costantemente protetta.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

La presenza di Oidio su grappolo sta via via aumentando rapidamente. Si consiglia di miscelare all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo Bagnabile**. In alternativa è possibile utilizzare **Zolfo in Polvere**.

MUFFA GRIGIA

Trattare

LOTTA INDIRETTA: Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale sfogliatura.

LOTTA DIRETTA: si consiglia di proseguire con la prevenzione utilizzando prodotti specifici a base di **Eugenolo + Geraniolo + Timolo** opp. di **Microrganismi** quali **Bacillus amyloliquefaciens**, **Bacillus subtilis** o **Trichoderma spp.**

Camera di Commercio
Alessandria-Asti

FLAVESCENZA DORATA

Prevenire

Si raccomanda di proseguire nella prevenzione con la sistematica eliminazione di tutta la vegetazione sintomatica.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI
Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617