

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 12 del 08.08.2024

Fase fenologica prevalente: **Inizio invaiatura**

## OIDIO

**Trattare**

In condizioni ordinarie, a seguito di un ottimale controllo della malattia ottenuto grazie ai precedenti interventi effettuati, si consiglia di impiegare come ultimo trattamento dell'annata contro il Mal Bianco, un prodotto antioidico a base di **Azoxistrobin**.

Nei casi invece in cui il mal bianco sia già diffusamente presente sui grappoli, occorrerà intraprendere strategie differenti: in tale situazione si consiglia di contattare il servizio tecnico per approfondimenti.

## PERONOSPORA

**Trattare**

La grande quantità di inoculo e le condizioni meteorologiche tutt'altro che stabilizzatesi, fanno sì che ad ogni pioggia o rugiada possa partire una nuova infezione peronosporica. Si consiglia di mantenere protetta la vegetazione, con prodotti a base di:

**Zoxamide** opp. **Rame**

Si ricorda che l'azoxistobin utilizzato come antioidico, se utilizzato al massimo dosaggio di etichetta, ha una rilevante azione anche come antiperonosporico.

Attenzione ai tempi di carenza!!

## GRANDINE

**Verificare**

Nei vigneti colpiti dalla grandine caduta nella giornata di Mercoledì 7 Agosto, si dovranno preferire prodotti a base di Rame e/o Zoxamide.



## FLAVESCENZA DORATA

**Prevenire**

Le aziende i cui vigneti sono stati monitorati all'interno del "Progetto Pilota Flavescenza Dorata della Provincia di Alessandria", nel caso fossero state registrate catture elevate, sono già state contattate direttamente ed invitate ad effettuare un terzo trattamento insetticida.

A tutte le aziende si raccomanda di proseguire nella prevenzione con la sistematica eliminazione della vegetazione sintomatica.