

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 2 del 16.04.2026

Fase fenologica prevalente: **Da Germogliamento a Grappoli visibili**

BIOLOGICO BIOLOGICO BIOLOGICO BIOLOGICO

PERONOSPORA

Valutare

In questo momento la vegetazione presenta uno sviluppo molto difforme e ai vigneti in cui il germogliamento è nella fase iniziale si alternano vigneti in cui la vegetazione supera i 30 cm. di lunghezza. Per i vigneti la cui vegetazione ha già superato i 10 cm. di lunghezza, si raccomanda di effettuare un primo intervento antiperonosporico a base di **Rame** addizionato eventualmente con **Distillato di legno**. È possibile in alternativa utilizzare **Sostanze di Base contenenti Chitosano**.

OIDIO

Trattare

La difesa della vite dal mal bianco è completamente efficace solo se si agisce con strategie preventive. Già in questa fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli, in formazione. Si consiglia pertanto di effettuare un intervento a base di **Zolfo bagnabile**. È possibile in alternativa intervenire con **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617