

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 3 del 29.04.2026

Fase fenologica prevalente: **Da Germogliamento a Grappoli visibili**

**BIOLOGICO BIOLOGICO BIOLOGICO BIOLOGICO**

## PERONOSPORA

**Trattare**

In questo momento la vegetazione presenta uno sviluppo molto difforme e, a vigneti, siti soprattutto nei fondovalle, in cui i germogli hanno appena raggiunto la lunghezza di 10 cm., si alternano realtà in cui la vegetazione è ormai all'ultimo filo.

In tutti i vigneti si raccomanda di effettuare un secondo intervento antiperonosporico a base di **Rame** addizionato eventualmente con **Distillato di legno**.

È possibile in alternativa utilizzare **Sostanze di Base contenenti Chitosano**.

## OIDIO

**Trattare**

La difesa della vite dal mal bianco è completamente efficace solo se si agisce con strategie preventive. Già in questa fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli, in formazione. Si consiglia pertanto di effettuare un intervento a base di **Zolfo bagnabile**.  
È possibile in alternativa intervenire con **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI