

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 3 del 29.04.2026

Fase fenologica prevalente: **Da Germogli 10 cm. a Grappoli visibili**

PERONOSPORA

Trattare

In questo momento la vegetazione presenta uno sviluppo molto difforme e, a vigneti, siti soprattutto nei fondovalle, in cui i germogli hanno appena raggiunto la lunghezza di 10 cm., si alternano realtà in cui la vegetazione è ormai all'ultimo filo. In tutti i vigneti **si raccomanda di intervenire non appena possibile**, con un trattamento a base di **Iprovalicarb + Folpet**

Si ricorda che i trattamenti di inizio stagione, soprattutto in annate piovose che seguono annate in cui la malattia è stata ovunque diffusa e aggressiva, sono essenziali per poter garantire nel prosieguo dell'annata la sanità dei grappoli.

OIDIO

Trattare

Già nella fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli in formazione. Si consiglia pertanto di unire all'antiperonosporico un antioidico a base di **Spiroxamina**. Si ricorda che fino al 30 settembre è ancora possibile l'impiego di **Meptyldinocap** (due trattamenti annui al massimo). Chi detenesse ancora formulati contenenti questa sostanza attiva, deve utilizzarli, in alternativa alla Spiroxamina, in questo trattamento.

Un'altra efficace alternativa nella difesa antioidica ai prodotti di sintesi citati è costituita dallo **Zolfo in Polvere**

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617