

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 10.06.2024

Fase fenologica prevalente: **Allegagione completata**

## BIOLOGICO

### PERONOSPORA

**Trattare**

La stagione è stata finora caratterizzata da piogge frequenti e abbondanti e l'esiguità delle possibilità di difesa disponibili per coloro che attuano strategie di lotta biologica, ha in certi casi causato perdite di produzione di differenti entità.

La discriminante tra successo ed insuccesso, più che dall'efficacia dei prodotti distribuiti è stata determinata dalla possibilità di accedere ai vigneti.

La malattia continua ad essere pericolosa e per scongiurare l'ingresso del patogeno all'interno degli acini, con possibili future manifestazioni ascrivibili alla forma "larvata" della peronospora, occorre proseguire sistematicamente nella prevenzione.

Per cui, completata la fase della fioritura della vite, e mantenendosi incerte le condizioni meteorologiche, si consiglia di intervenire con prodotti a base di **RAME** con intervalli non superiori ai 7 giorni.

*Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.*

## OIDIO

**Trattare**

A causa della particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo Bagnabile**

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617