

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 11 del 19.07.2024

Fase fenologica prevalente: **Chiusura grappolo**

PERONOSPORA

Trattare

Nonostante il clima stia progressivamente stabilizzandosi ed acquisendo connotazioni tipicamente estive, le numerose infezioni che si sono accavallate e succedute negli ultimi due mesi hanno determinato una presenza diffusa dei sintomi della malattia con presenza, in alcuni casi, della forma larvata di peronospora con interessamento dei grappoli.

In queste condizioni ogni pioggia e ogni rugiada possono dare il via a nuove infezioni. È quindi opportuno proseguire nella difesa per proteggere sia la nuova vegetazione che i grappoli utilizzando prodotti antiperonosporici a base di

Mandipropamide + Zoxamide oppure **Rame**

con l'eventuale aggiunta di **Fosetil Alluminio**

utilizzare le dosi a ettaro e trattare entro Mercoledì 24 luglio.

OIDIO

Trattare

Quella attuale è la fase di maggiore delicatezza della vite agli attacchi del fungo sia su grappoli che su foglie.

Si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Ciflufenamid** o **Proquinazid** o **Metrafenone**.

Se fosse possibile sarebbe importante, in alternativa o in aggiunta, intervenire con Zolfo in Polvere.

MUFFA GRIGIA

Intervenire

LOTTA INDIRETTA: Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale sfogliatura evitando di eccedere per limitare le possibili scottature dovute all'esposizione diretta al sole. Una vegetazione ordinata è presupposto di migliore efficacia dei trattamenti.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617