

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 22.05.2024

Fase fenologica prevalente: **Grappoli separati – Bottoni fiorali separati**

PERONOSPORA

Trattare

Le condizioni meteorologiche permangono incerte e nemmeno nei prossimi giorni è previsto che si stabilizzino verso il bello. In una tale situazione, l'unica possibile strategia è quella di continuare con l'utilizzo di principi attivi che, penetrando all'interno dei tessuti e sfuggendo al dilavamento, abbiano un'azione sia preventiva che curativa.

Si ribadisce quindi il consiglio di sfruttare ogni "finestra" di tempo sereno e di transitabilità dei terreni per intervenire con prodotti a base di:

Metalaxil-M + Folpet

con l'eventuale aggiunta di **Fosetil Alluminio**

L'utilizzo del Folpet (massimo 4 trattamenti all'anno) come partner di copertura è da mettersi in relazione alla sua azione secondaria contro la Muffa grigia.

OIDIO

Trattare

A causa della particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico sistemico (I.B.E.).

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617