

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 3 del 29.04.2024

Fase fenologica prevalente: **Grappoli visibili/separati**

PERONOSPORA

Trattare

La vite ha ormai raggiunto, un po' in tutte le situazioni e le esposizioni, uno sviluppo tale da renderla sensibile agli attacchi di questo patogeno e, anche nei vigneti dal germogliamento più tardivo, le foglie basali devono essere considerate recettive. Persistono, nel contempo, condizioni di instabilità con piogge frequenti e temperature altalenanti.

In questa situazione si consiglia di intervenire,
NON APPENA LA TRANSITABILITA' DEI TERRENI LO CONSENTA,
con prodotti a base di:

Dimetomorf oppure **Mandipropamid + Folpet**

ESCORIOSI

Trattare

Sono state osservate, soprattutto su vitigni particolarmente sensibili quali Grignolino e Freisa, manifestazioni ascrivibili alla malattia. Il trattamento consigliato contro la Peronospora svolge un'azione di controllo anche su questo patogeno.

OIDIO

Trattare

A causa della particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Meptyl-dinocap**

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617